



## VINODAR 9.5.15

NPK 9.5.15+ 2 MgO + 21 SO<sub>3</sub> + 0,05 B + 0,01 Zn + 9C



- ALTO CONTENUTO IN SOSTANZA ORGANICA ATTIVA
- MIGLIORA LA CAPACITÀ DI SCAMBIO CATIONICO E RIVITALIZZA IL TERRENO
- AZIONE CHELANTE ED ACIDIFICANTE CHE MIGLIORA L'ASSORBIMENTO DEGLI ELEMENTI
- RICCO E BILANCIATO PER COLTURE DI PREGIO



Scarica la scheda tecnica di questo prodotto

### CONFEZIONI

Sacchi da kg 25 - Big bag da kg 500

**VINODAR 9.5.15** consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio esclusivamente da solfato, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata e di meso e micro elementi tra i quali spiccano lo Zolfo e il Boro. E' noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici). La matrice organica di **VINODAR 9.5.15** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **VINODAR 9.5.15** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio, lo zolfo, il boro e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno

### FORMULAZIONE

Pellet Ø 3,8 mm

### MATERIE PRIME

Letame essiccato, fosfato biammonico, solfato ammonico, solfato di potassio, sali di ferro (solfato), acido boricco, ossido di magnesio, urea formaldeide.

### COMPOSIZIONE

<b>Azoto (N) totale</b>	<b>9</b>
<b>Azoto (N) organico</b>	<b>2</b>
<b>Azoto (N) ammoniacale</b>	<b>7</b>
<b>Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale</b>	<b>5</b>
<b>Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) sol. in citrato e acqua</b>	<b>4</b>
<b>Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) sol. in acqua</b>	<b>3</b>
<b>Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua</b>	<b>15</b>
Ossido di calcio (CaO) totale	2
<b>Ossido di magnesio (MgO) totale</b>	<b>2</b>
<b>Anidride solforica (SO<sub>3</sub>) totale</b>	<b>21</b>
<b>Boro (B) totale</b>	<b>0,05</b>
<b>Ferro (Fe) totale</b>	<b>0,6</b>
<b>Zinco (Zn) totale</b>	<b>0,01</b>
<b>Carbonio (C) organico di origine biologica</b>	<b>9</b>
Acidi umici e fulvici	4
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

### DOSI D'IMPIEGO

	<b>Kg/ha</b>
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	700 - 1200
Ortaggi a pieno campo	600 - 1200
Pomodoro	500 - 900
Colture floricole e ornamentali	600 - 800
Vivaio	800 - 1000
Pomacee	600 - 750
Drupacee	550 - 650
Kiwi	450 - 550
Vite da vino	400 - 600
Vite da uva	600 - 800
Olivo	600 - 750

### CONSIGLIATO PER:

